

El Despique: Actividad única pero determinante en el desempeño productivo de los lotes

20 de Abril de 2016

Suscríbase a nuestra web y haga parte de la comunidad virtual en donde podrá acceder a contenido técnico especializado y participar en nuestras capacitaciones gratuitas online.

 Pronavícola S.A  @PronavicolaSA  www.pronavicola.com





OBJETIVO

El despique se realiza con el objetivo de:

- Disminuir el riesgo de picaje o canibalismo .
- Evitar selección y desperdicios de alimento.
- Disminuir rotura y consumo de huevos.
- Las aves despicadas son más tranquilas.
- Evita pérdida de plumas y prolapsos.





Tener en cuenta que...

-Esta actividad representa un trauma severo para el ave.

-Si se realiza mal esta labor se pueden perder muchas aves para producción.

-Disminución en el consumo de alimento, pérdida de peso y uniformidad.

Por tal razón se debe realizar con el mayor cuidado, consciencia y paciencia.... Despigar es todo un arte!!

El canibalismo o picaje entre las gallinas no surge espontáneamente, se presenta cuando las aves se encuentran bajo condiciones de estrés:

- Altas temperaturas
- Altas densidades
- Deficiencias nutricionales

Debemos evitarlas a toda costa!!







La máquina

- Son de la reconocida marca Lyon.
- Hacer mantenimiento constante de las máquinas (trabajan con energía eléctrica) para evitar lesiones en el personal.
- Después de terminada la labor, debe asearse y desinfectarse antes de guardarla.
- Preferiblemente cada granja debe tener sus propias máquinas.
- El rendimiento por máquina puede estar al rededor 2.000 aves/día.





Las cuchillas

Las cuchillas empleadas son las BC (despunte), K (aves de 4 a 8 semanas) y S (pollas mayores y ponedoras).

Se utiliza una cuchilla por cada 700 a 1.000 aves.

Deben ser cambiadas al detectar algún inconveniente para realizar un corte adecuadamente limpio.



Las cuchillas

La forma práctica de graduar la temperatura de la cuchilla es permitir una coloración roja en el centro (punto de corte) y oscura hacia los extremos.




Métodos

- Despunte con rayos infra-rojos al 1er día (reciente).
- Despunte en la primera semana (precisión) y alrededor de 8ª semana (corrección).
- Corte único de ambas porciones entre 4ª y 6ª semana.

DESPIQUE ÚNICO 4 a 6 sem.

- Disminuye manipulación, estrés en las aves.
- Menos afectación en consumo y peso.
- Por ser aves más jóvenes se recuperan mas fácilmente.
- Dieta iniciación mejor calidad nutricional que dieta de levante, esto ayuda a que las aves se recuperen mejor.
- Más tiempo de recuperación para cuando se inicia la vacunación con oleosas.


Ganancias de peso y cambios fisiológicos




Guillermo Diaz, Bogotá, Mayo 2007.

DESPIQUE ÚNICO 4 a 6 sem.

- Empiece con un número pequeño de aves del lote.
- Haga seguimiento y mida los beneficios.
- Poco a poco para ir entrenando al personal.





El corte se debe realizar a cada porción del pico por separado.

Colocar un dedo por delante de la lengua para evitar lesionarla.

El pico inferior presenta una zona pálida unida a una zona rosada, se realiza el corte antes de iniciar la coloración rosada. Con esta referencia se corta el pico superior.



Procurar al máximo que los cortes queden casi al mismo nivel para obtener un pico lo más parejo posible. No halar el pico al cortar.

El corte y la cauterización se realizan en un solo tiempo (simultáneamente), permitiendo el contacto del pico 2-3 segundos después de realizado el corte.





Recomendaciones

- Revisar cuidadosamente el lote antes de iniciar el despique.
- Para evitar hemorragias severas, excesivas cauterizaciones, suministrar Vitamina K durante 4 a 5 días antes del inicio del despique y durante el mismo.
- Suministrar analgésicos (acetaminofén) y multivitamínicos.

Recomendaciones

- Retirar el alimento a las aves antes del despique.
- Ofrecer abundante alimento a las aves recién despicadas.
- Mantener los bebederos bajos y con suficiente nivel de agua.
- Buscar la mayor comodidad para el personal y dar periodos de descanso durante la labor.



Evitar a toda costa tiempos de cauterización prolongados y temperaturas excesivas!!!!...esta lesión es irreversible.



Evitar errores....

Cuchillas frías, mala posición...



Evitar errores....

Pico inferior largo



Evitar errores....

Pico inferior fracturado, quemadura en paladar





Evitar errores....

Cortes excesivos



Evitar errores....

Excesiva cauterización



Evitar errores....

Poca cauterización, hemorragias, Sin Vit. K



Evitar errores....

Picos en pala



Evitar errores...





Suscríbese a nuestra web y haga parte de la comunidad virtual en donde podrá acceder a contenido técnico especializado y participar en nuestras capacitaciones gratuitas online.



Pronavícola S.A



@PronavicolaSA



www.pronavicola.com

PRODUCTORA NACIONAL AVICOLA S.A.

Tel +57 2 237 4242 - Cel 316-8760468 Calle 8 # 20-360 Buga - Colombia

www.pronavicola.com